

Indicazioni

Agpeg OS Liquido è un dispositivo medico per uso orale indicato per il trattamento sintomatico della stipsi. Grazie al Macrogol 3350, Agpeg OS Liquido favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

Come agisce

Il macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione e un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido.

Composizione

Acqua depurata, macrogol, acido citrico, potassio sorbato, sodio benzoato, sucralosio. **Senza glutine.**

Modalità di assunzione e posologia

Utilizzare il misurino contenuto nella confezione per dosare la soluzione orale: riempirlo in base alla posologia sotto indicata, servendosi dei riferimenti forniti dalle tacche presenti sulla superficie del misurino (prima tacca 5 ml, seconda tacca 10 ml, terza tacca 15 ml e quarta tacca 20 ml). Le dosi sottoindicate devono essere aumentate o diminuite, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni:


- da 20 ml a 80 ml al giorno

La dose massima necessaria non supera normalmente gli 80 ml al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua per ogni 20 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (20 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni:

- da 6-10 Kg: 10 ml al giorno
- da 10-15 Kg: da 10 ml a 20 ml al giorno
- da 16-20 Kg: da 20 ml a 30 ml al giorno
- da 21-43 Kg: da 30 ml a 40 ml al giorno

La dose massima necessaria non supera normalmente i 40 ml al giorno. La soluzione orale



va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 60 ml di acqua per ogni 10 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (10 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Confezione: 480 ml

Modalità di conservazione

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Richiudere accuratamente il contenitore dopo l'uso. Una volta aperto, utilizzare il prodotto entro 3 mesi. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Controindicazioni

Non assumere Agpeg OS Liquido in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Ileo paralitico
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

Effetti indesiderati

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di Agpeg OS Liquido ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione. Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.

Avvertenze

Si consiglia di utilizzare il prodotto in età pediatrica dopo aver consultato il medico. La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto. Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

Dispositivo medico  0373